Frågor ställda av finska producenter av regnbåge

1. **Vilka är kraven som ställs på leverantörer av fiskyngel om fiskynglen har en storlek som enligt ASC:s definition är större än 10 g?**

   S: Se QA171 för liknande fall.

   ASC försöker för tillfället hitta ett godtagbart tillvägagångssätt som är i linje med avsikten för ASC Trout Standarden och ett tillvägagångssätt för mellanstora anläggningar enligt ASC Farm Standard.
   ASC utarbetar ett Q&A om detta ärende och det kommer att bli tillgänglig på ASC VR Platform.

2. **Hur är det med Multisites? Vissa anläggningar bedriver odlingsverksamhet i två länder (Sverige och Finland)**

   S: En Multisite-certifiering kan inte användas i olika länder.
   Mer information om de olika typerna av certifiering beskrivs i 5.3 i ASC Requirement for Unit of Certification (RUoC) dokumentet

   ASC-Farm-RUoC-v1.0-July-22.pdf

3. **På vilket djup ska TP mätas**

   S: Enligt Bilaga II-G ska TP-mätningarna tas från ett representativt sammansatt prov genom vattenpelaren ända till ett djup vid **kassarnas botten.**

4. **Med vilken frekvens ska vattenproverna tas?**

   S: ASC Trout Standarden, bilaga II-G bestämmer frekvensen för vattenproven till en gång var tredje månad under perioder utan is.

5. **Enligt Trout standard ska TP mätas minst var tredje månad. Men enligt punkt 3.3.4. i granskningsmanualen ska anläggningarna för definiering av bakgrundsnivåer vid TP månatligen tillhandahålla uppgifter åt CAB. Är det endast bakgrundsnivåerna för TP som ska mätas månatligen? Samma fråga gällande DO-mätningar.**

   S: Proverna ska tas minst en gång var tredje månad (dvs kvartalsvis) under perioder utan is. När det hänvisas till ”provide monthly TP monitoring.....", 3.3.4 d. hänvisar man till det prov som tas under en viss "månad" inom det kvartalet.

6. **Om anläggningen själv utför vattenkvalitetsövervakningen är det problematiskt att mäta mängden syre på ett tillförlitligt sätt vid botten på djupa ställen, speciellt med en lätt syreelektrod (flödet kan ta den). Är det acceptabelt att mäta syret till exempel vid kassarnas botten eller på 10 meters djup?**

   S: DO ska mätas 50 cm ovanom bottensedimentet. Varje avvikelse från detta kräver en variansförfrågan

7. **Enligt instruktionerna ska vattenproverna tas minst en gång var tredje månad (dvs kvartalsvis) under den isfria perioden. Kassarna är på odlingsplatserna ungefär från**

april till november (7-8 månader) och avvikelser i vattenkvaliteten är naturligtvis stora under den perioden.
Hur många observationsbesök kan man förvänta sig

S: Frekvensen enligt bilaga II-G gäller. ASC känner till att naturliga fluktuationer uppstår och betraktar fortfarande TP som generellt det bästa enheten.

8. **Fisken är vid uppfödningsplatsen under 2 isfria säsonger för att nå slaktstorlek. Ska övervakningen av vattenkvaliteten fortsätta under det andra odlingsåret?**

S: ASC-certifierade anläggningar förväntas uppfylla alla standardindikatorer under hela odlingsperioden. Alla indikatorer (t.ex. i bilaga II-G) för vattenkvaliteten ska alltså uppfyllas.

9. **Vad blir konsekvenserna om certifieringen för foder som innehåller MSC FMFO upphävs**

S: Enligt Fotnot 163 i ASC Feed Standard: I en situation var en UoC kan påvisa att dess marina ingredienser är beroende av ett enskilt fiske, och att det inte är möjligt att byta ursprung, tillåts fodertillverkaren att utöka sin cykel för den nuvarande marina hållbarhetsnivån i högst 3 år för att vara i linje med FIP-framstegen.

Bevis som stöd (levererande fiskerienhet, status för FIP-framsteg och förväntad tidpunkt för slutförande) ska läggas till som en bilaga till ASC:s revisionsrapport.